

Auswahl von Produkten für die Mundpflege bei Pflegebedürftigen

Duraphat-Zahnpaste



Anwendung:

- Einmal pro Woche anstelle der gewöhnlichen Zahnpaste
- Nach dem Zähnebürsten ausspucken lassen und nicht mit Wasser spülen

Plak-out-Gel



Anwendung:

- Bei stark **entzündetem** (blutendem) Zahnfleisch - Bei Personen, die nicht in der Lage sind zu spülen
- Zweimal täglich mit dem Finger auf die betroffenen Stellen auftragen
- Unmittelbar danach nicht trinken
- Anwenden bis die kleine Tube (5 g) aufgebraucht ist

Chlorhexamed-Spüllösung oder andere Produkte mit Chlorhexidin



Anwendung:

- Bei stark **entzündetem** (blutendem) Zahnfleisch
- Bei Personen, die spülen können
- Zweimal täglich mit 10 ml (siehe Verschlusskappe) unverdünnter Lösung während 30 Sekunden spülen lassen
- Ausspucken lassen und nicht mit Wasser nachspülen
- Anwenden während zwei Wochen

Produkte für Spezialfälle


Emofresh und Aldiamed-Gel



Anwendung:

- Bei **Mundtrockenheit**
- Mehrmals täglich je 1 cm Gel mit dem Finger auf die Schleimhäute und auf die Zunge auftragen

Solcoseryl-Paste



Anwendung:

- Bei leichten **Verletzungen** der Mundschleimhaut (Aphten, Prothesendruckstellen)
- 1 bis 2 mal täglich auf die mit einer Gaze abgetupfte Wundstelle dünn auftragen

Grosse Wattestäbchen



Anwendung:

- Wenn Zähnebürsten und Spülen nicht möglich
- Um Speisereste zu entfernen und den Mund zu befeuchten (z.B. mit Aldiamed, Kamillosan, Malve-Kaltauszug)